
Что делать, если ребенок боится уколов?

- 1) Предварительно настройте ребенка на визит к врачу и на медицинские манипуляции. Спокойно и понятно объясните ребенку, зачем нужен укол: как он поможет здоровью и самочувствию.
- 2) Не запугивайте ребенка медицинскими манипуляциями. Не грозите при непослушании сердитыми докторами и больными уколами, чтобы у малыша не закрепилось понятие «укол = страх или наказание».
- 3) Будьте честны с ребенком. Признайте, что иногда уколы действительно могут быть неприятными и болезненными.
- 4) Объясните ребенку, что эта процедура совсем недолгая.
- 5) Проявляйте сочувствие. Не высмеивайте переживания, не ругайте за слезы, воспримите всерьез страх и волнение перед уколом.
- б) Играйте с ребенком в тематические игры. Купите детский набор доктора, в котором есть игрушечные шприцы, стетоскоп и другие предметы, которые малыш встречает на приеме у доктора. Когда ситуация становится ребенку знакомой через игры, он меньше тревожится и переживает.
- 7) Когда вы уже пришли на процедуру, постарайтесь ребенка отвлечь OT наблюдения за действиями врача, переключив 6L0 внимание. Увлеките его любимой новой игрушкой, погладьте, спрашивайте ребенка о чем-то,



Уважаемые родители! Вакцинация – это крайне важная составляющая здоровья и благополучия детей и взрослых. Пожалуйста, не пренебрегайте прививками. Все волнующие вас вопросы обсуждайте с лечащим врачом и берите информацию из надежных и проверенных источников.



ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Юридический адрес: г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36

Телефон: 8 (4872) 41-09-50 E-mail: srtc.tcpd@tularegion.ru

Сайт: srcn1-tula.ru

Служба «Дети в семье»

Адрес: г. Тула, ул. Тульского Рабочего Полка, д.

100 B

Телефон: 8 (4872) 21-96-90











Министерство труда и социальной защиты Тульской области

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Вакцинация детей



Какие прививки необходимы детям?

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

профиликтических прививок	
Возраст ребенка	Прививка
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные на 3 - 7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза
1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
2 месяца	 Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
3 месяца	 Первая вакцинация против дифтерии, ко-клюша, столбняка Первая вакцинация против полиомиелита Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
4, 5 месяцев	 Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) Вторая вакцинация против полиомиелита Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Возраст ребенка	Прививка
6 месяцев	 Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Третья вакцинация против вирусного гепатита В Третья вакцинация против полиомиелита Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска)
12 месяцев	 Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)
15 месяцев	Ревакцинация против пневмо- кокковой инфекции
18 месяцев	 Первая ревакцинация против полиомиелита Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6 - 7 лет	 Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберку- леза
14 лет	• Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка • Третья ревакцинация против полиомиелита
Дети с 6 ме- сяцев, уча- щиеся 1 - 11 классов	Вакцинация против гриппа

Медицинский отвод от прививок. Противопоказания к вакцинации

Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.

Большинство противопоказаний против прививок можно отнести к временным.

Чаще всего это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В этом случае плановые прививки проводятся через 2 - 4 недели после выздоровления или в период ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводятся после нормализации температуры.

Важно! Решение об установлении и снятии медицинского отвода принимает лечащий врач.

